

## Liite 2.

### Kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävä Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) -luokitus (Lilja-Maula ym. 2016)

	BOAS-aste <sup>a</sup>			
	BOAS-		BOAS+	
	0	1 <sup>b</sup>	2 <sup>b</sup>	3
<b>Ylähengitysäänet<sup>c</sup> levossa</b> 0 = ei kuuluvissa 1 = lievät 2 = kohtalaiset 3 = selvästi äänekkäät	0	0-1	1-2	2-3
<b>Ylähengitysäänet<sup>c</sup> liikunnan jälkeen</b> 0 = ei kuuluvissa 1 = lievät 2 = kohtalaiset 3 = selvästi äänekkäät	0	1-2	1-2	2-3
<b>Hengitystyyppi levossa</b> 0 = normaali 1 = käyttää hengityksen apulihaksia <sup>d</sup>	0	0	0-1	1
<b>Hengenahdistusta tai limakalvojen sinerrystä levossa</b> 0 = ei havaittavissa 1 = havaittavissa	0	0	0	0-1

<sup>a</sup>BOAS-oireiden aste: 0 = ei oireita; 1 = lievät, 2 = kohtalaiset, 3 = vakavat oireet.

<sup>b</sup>Koira saa kokonaisarvioksi seuraavan BOAS luokan, jos sen kaikki oireet ovat ylärajoilla.

<sup>c</sup>Ilman auskultaatiota kuuluvat hengitysäänet.

<sup>d</sup>Apulihasten käyttö ilmeistä: näkyy voimistuneena sierainten, rintakehän ja vatsan liikkeinä.

**Koiran BOAS-oireiden aste (0, 1, 2 tai 3) merkitään kävelytestilomakkeeseen.**